

Fonds de bergerie

Samedi 11 février 2017 chez Régis Fresneau Ferme du Vallon de Toulan 44630 Plessé

Présents : Séverine et Alain Balay (56 Nivillac) – Jean-Luc Gion (44 Avesnac) – Roger Bombaers (56 Limmerzel) – Victorien Guillaume (35 Chanteloup) – Paul Chauvel (44 Fégréac) – Hélène Madru-Dieuzy (56 Nivillac) – Régis Fresneau (44 Plessé)

Tour de table de présentation de chacun.

Présentation élevage Toulan :

- 80 brebis Landes de Bretagne sur 11.5 ha en bio depuis 2007 + parcelles d'éco pâturage en contrat rémunérés (2.7 ha)
- Le pâturage est tournant sur parcelles de prairies permanentes à naturelles (+ ou – humides)
- Une partie du foin est réalisée à l'extérieur
- Les brebis sont rentrées le soir pendant 3 mois l'hiver avec distribution foin au râtelier + mélange céréalier (jusqu'à 250grs/jour)
- Production d'agneaux vendus en direct à la ferme en colis d'un ½ à l'âge de 6 à 11 mois + 1 lot de 6 à 9 castrés vendu en début de printemps suivant – quelques carcasses vendues à 1 ou 2 restaurateurs gastro

Discussion 1 : L'identification et la prophylaxie pour les petits élevages (moins de 5 brebis)

Il est insisté sur l'identification comme moyen de filier ses animaux et indispensable pour vendre des reproducteurs.

Tour à la bergerie devant une partie des animaux rentrés :

- Quelques outils indispensables comme **la canne de berger**
- Eléments de description morphologique et insistance sur les aptitudes fonctionnelles à surveiller :
 - **Les aplombs**
 - **La mâchoire (prognathisme)**

Discussion 2 autour du sanitaire préventif (contrôle du parasitisme)

Exemple de planification d'interventions à Toulan :

- **Agneaux** :
 - Drogage SPECIAL C (Biomat Legé) en février (2 fois à 3 semaines d'intervalle) pour coccidies
 - Drogage ANIVER (Biomat Legé) en avril
 - **Coproscopie 1** : en mai (jusqu'à présent = pas besoin de vermifuger)
 - **Coproscopie 2** : fin juin + vermifuge (VALBAZEN)
 - Vermifuge (avec ou sans copro) en septembre si diarrhées inexplicables d'un point de vue alimentaire
- **Adultes** :
 - béliers vermifugés (VALBAZEN) une fois par an en fin printemps avant lutte
 - Brebis non vermifugées systématiquement, seulement au cas par cas en hiver si «**syndrome de la bouteille** » repéré sur 3 à 5 brebis
 - Mouillage bassines de minéraux avec ANIVER en fin hiver-début printemps

Composition des bassines de minéraux :

- Hiver : 1kg lithotamme + 1kg argile + 500grs sel (+ ANIVER ponctuellement)
- Été-automne : 1kg argile + 500grs sel

Discussion 3 sur la qualité organoleptique de nos viandes :

- Nécessaire **maturation des carcasses** (4-5 jours mini), puis ensuite des morceaux (si sous vide)
- Ne pas avoir peur de garder ses agneaux jusqu'au poids optimal, ceci même s'il prend de l'âge (pas de constat de renforcement goût sur la plupart des morceaux – sauf peut-être le collier)